

QUAND PRÉLEVER ?

- De préférence en période humide sur sol ressuyé (lors de forte activité biologique)
- Avant l'application de fumier ou amendement
- À une température de sol supérieur à 12°

COMMENT PRELEVER ?

Veillez respecter les mesures suivantes pour optimiser la qualité de l'analyse :

- Évitez les bordures de champs. Minimum 10m du bord de champ
- Réaliser les prélèvements sur une parcelle homogène avec coordonnées GPS de préférence.
- Prélever au moins 10-15 carottes dans un seau très propre puis homogénéiser vos prélèvements
- Prélever sur une profondeur de 0 à 15 cm de préférence (c'est l'horizon de fertilité principal)
- Vous pouvez également mesurer des horizons plus profonds 15-30 ; 30-60 pour étudier le sous-sol
- Enlevez les cailloux et gros débris organique
- Pour les répétitions, prélever tout le temps au même endroit et à la même profondeur
- **TAILLE DE L'ÉCHANTILLON : MINIMUM 100 gr de sol par échantillon.**

RENSEIGNER LA FEUILLE DE PRELEVEMENT

- Indiquez la profondeur de prélèvement
- Renseignez la culture, les pratiques culturales, l'historique d'amendement pour une interprétation précise et des recommandations adaptées

ENVOI DES ÉCHANTILLONS

- Mettez votre échantillon dans un sachet zip et y inscrire les informations essentielles au marqueur indélébile pour l'identification.
- Vos résultats seront envoyés par mail
- **Envoyer nous vos échantillons directement à :**

Symbiotik agroecologie
1574 route départementale N8
42600 Montbrison
France