

QUAND PRÉLEVER ?

- De préférence en période humide lors de forte activité biologique
- A distance d'un apport récent de fumier/compost ou amendement organique si vous souhaitez une valeur de référence (3-4 semaines minimum)
- À une température de sol supérieur à 8-10°C lorsque cela est possible

COMMENT PRELEVER ?

Veillez respecter les mesures suivantes pour optimiser la qualité de l'analyse :

- Évitez les bordures de champs. Minimum 10m du bord de champ
- Réaliser les prélèvements **sur une parcelle homogène** avec coordonnées GPS de préférence.
- Prélever au moins 10-15 carottes dans un seau très propre puis homogénéisez vos prélèvements
- Prélever sur une profondeur de 0 à 20 cm (ou votre profondeur habituelle d'analyse de terre)
- Enlevez les cailloux et gros débris organique (racines, résidus grossiers non représentatifs)
- Pour les répétitions, prélever tout le temps au même endroit et à la même profondeur
- **TAILLE DE L'ECHANTILLON : pour une analyse de fractionnement de MO seul 50grammes de terre fraîche suffisent, si en complément d'une analyse de terre ajoutez 50grammes à la quantité demandée**

RENSEIGNER LA FEUILLE DE PRELEVEMENT

- Indiquez la profondeur de prélèvement
- Renseignez la culture, les pratiques culturales, l'historique d'amendement
- **Cochez la case (fractionnement MO labile.stable)**

ENVOI DES ÉCHANTILLONS

- Mettez votre échantillon dans un sachet zip et y inscrire les informations essentielles au marqueur indélébile pour l'identification.
- Vos résultats seront envoyés par mail
- **Envoyer nous vos échantillons par vos propres moyens (colissimo de préférence) directement à :**

Symbiotik agroecologie
1574 route départementale N8
42600 Champdieu
France